Катетер внутривенный Trogue(Hamburg) Novo Plus

Цена:	Размер:		Упаковка:
По запросу	G18	Да	**100 шт.**

Производитель: Название производителя

Описание

Внутривенные периферические катетеры . TRO-VENOCATH novo plus с инъекционным портом и крыльями (PUR *) (канюли интравенозные) предназначены для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии. Внутривенный периферический катетер с инъекционным клапаном позволяет просто и быстро ввести дополнительные медикаменты.

Техника установки катетера в вену – « Катетер на игле». Специально для данной техники установки кончик катетера имеет плавное конусовидное сужение, а проводниковая игла особую геометрию острия (трехгранная заточка с обратным боковым срезом и специальная шлифовка иглы), которые обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда.

Камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венепункции.

Специальные «крылышки» позволяют надежно зафиксировать катетер на коже пациента, тем самым значительно снизить риск механического повреждения внутренней стенки сосуда и развития механического флебита.

Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость
инфузии при минимальном диаметре катетера.

Материал катетера TRO-VENOCATH plus (Teflon - Тефлон): упругий с гладкой поверхностью для стандартных случаев со сроком катетеризации в пределах

24-48 часов.

Материал катетера TRO-VENOCATH novo plus (PUR* - полиуретан): более мягкий и термопластичный PUR* (полиуретан) для сложных вен и более длительной катетеризации в пределах 72 часов(модифицированный полиуретан, более мягкий и термопластичный для сложных вен и длительной катетеризации в пределах 48-72 часов).

Инъекционный порт для болюсного введения медикаментов и промывания катетера.

Безлатексная технология производства катетеров - гарантия отсутствия риска развития аллергических реакций на латекс.

Внутривенный периферический катетер семейства TRO-VENOCATH не содержат ПВХ и может использоваться для введения особых групп лекарственных средств.

Рентгеноконтрастная трубка катетера обеспечивает дополнительную степень безопасности, позволяя осуществлять контроль за дистальным кончиком катетера в случае его повреждения.

Стерилизация: Оксидом этилена
Срок годности: 5 лет.
Упаковка: Индивидуальная, блистерная «Tyvek».
Количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт.